

KQ 1. 3개월이상 지속된 고관절통증으로 내원한 40세 미만의 성인에서 방사선촬영은 정상이거나 진단이 불충분할 때, 고관절의 비구순 파열을 진단하기 위하여 적절한 영상 검사는 무엇인가?

(1) 국외DB 검색전략 및 결과

표 1. 근골격 핵심질문 1 국외 Ovid-Medline

검색일: 2019. 05. 03			
구분	N	검색어	검색 결과
P	1	exp Femur Head Necrosis/ OR exp Osteoarthritis, Hip/	15,057
	2	((hip or femoral or femur) and pain) or labral tear).mp.	29,392
	3	or/1-2	41,197
검사	4	(MR arthrography OR MRA OR (hip AND imaging)).mp	40,395
	5	Magnetic Resonance Imaging/ and arthrograph\$.mp	2,065
	6	4 OR 5	41,421
P&검사	7	3 AND 6	9,734
지침필터	8	(guideline\$ or recommendation\$ or statement).ti. or (practice guideline or guideline).pt	129,100
총합	9	7 AND 8	29

표 2. 근골격 핵심질문 1 국외 Ovid-Embase

검색일: 2019. 05. 03			
구분	N	검색어	검색 결과
P	1	exp Femur Head Necrosis/ OR exp hip osteoarthritis/	15,057
	2	((hip or femoral or femur) and pain) or labral tear).mp.	54,124
	3	or/1-2	65,159
검사	4	(MR arthrography OR MRA OR (hip AND imaging)).mp	32,762
	5	nuclear magnetic resonance imaging/ and arthrograph\$.mp	3,243
	6	4 OR 5	34,558
P&검사	7	3 AND 6	309
지침 필터	8	(guideline\$ or recommendation\$ or statement).ti. not (letter or editorial or conference paper or conference abstract).pt.	115,044
총합	9	7 AND 8	21

표 3. 근골격 핵심질문 1 국외 GIN

검색일: 2019. 05. 03		
N	검색어	검색 결과
1	hip joint arthritis	4
2	hip joint necrosis	0

국내DB 검색전략 및 결과

표 4. 근골격 핵심질문 1 국내 문헌DB

검색일: 2019. 05. 03				
검색 사이트	N	검색어	관련문헌	비고

검색일: 2019. 05. 03				
검색 사이트	N	검색어	관련문헌	비고
1.KoreaMed	1	hip joint arthritis[ALL] and hip joint necrosis[ALL] and guideline [ALL]	0	
	2	hip joint arthritis[ALL] and hip joint necrosis[ALL] and recommendation[ALL]	0	
	3	소계	0	
	4	단순중복 제거 후	0	
2.KMBASE	1	([ALL=고관절염] AND [ALL=고관절괴사] AND [ALL=지침])	0	
	2	([ALL=고관절염] AND [ALL=고관절괴사] AND [ALL=권고])	0	
	3	([ALL=고관절염] AND [ALL=고관절괴사] AND [ALL=가이드라인])	0	
	4	소계	0	
	5	단순중복 제거 후	0	

표 5. 근골격 핵심질문 1 국내 진료지침DB

검색사이트	N	지침 제목	연도	개발학회
KoMGI	1	* 검색결과 없음		
	2	소계 (0건)		




그림 1. 근골격 핵심질문 1 흐름도